

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU ZAĆMY

Zabieg wykonuje się ambulatoryjnie w znieczuleniu kroplowym. Jest niebolesny, po uprzednim ogólnym przygotowaniu i przy zachowaniu pełnej świadomości przeprowadzanej operacji.

Do zabiegu niezbędne jest skompletowanie niżej wymienionych dokumentów:

1. orzeczenie pisemne od lekarza internisty lub rodzinnego o stanie wydolności układu krążenia i oddechowego oraz braku przeciwwskazań ogólnych do wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym
2. skierowanie do poradni okulistycznej od lekarza internisty lub rodzinnego – jeśli nie było dostarczone na wizytę przygotowującą pacjenta do operacji (w przypadku braku skierowania opłata za wizytę kontrolną po zabiegu wynosi 100 zł)
3. skierowanie do szpitala na operację zaćmy od lekarza kierującego (okulisty) na zabieg z datą wpisu na listę oczekujących
4. **aktualne wyniki badań krwi : morfologia, OB, czas krwawienia /krzepnięcia**
5. zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wzv B – nieobowiązkowo

Zabieg operacyjny przeprowadzony zostanie na sali zabiegowej okulistyki w Centrum Medycznym AMIKA przy ulicy Piastów 16 we Wrześni – **parter BLOK OPERACYJNY**.

Proszę na 7 dni przed zabiegiem potwierdzić przybycie na zabieg operacyjny osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 437 77 43

Niezgłoszenie się na zabieg bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy oczekujących na zabieg.

REZYGNACJA Z ZABIEGU ZAĆMY BEZ UZASADNIIONEGO POWODU ZDROWOTNEGO WIAŻE SIĘ Z OBCIĄŻENIEM PACJENTA KOSZTAMI WIZYTY KWALIFIKUJĄCEJ ZA ZABIEG – 150 ZŁ.

Proszę ubrać się przewiewnie, lekko, **niepotrzebna jest piżama**.

Przed zabiegiem operacyjnym trzeba spożyć lekkie śniadanie i obiad.

Nie przerywać stosowania leków dotąd używanych; wyjątek stanowią leki tzw.

"rozrzedzające krew" np. Acard, Aspiryna, Bepiryn, Etopiryna, Polopiryna,

Acenocumarol, Aclotin, Ticlo, Polocard, Syncular, Sintrom, itp. Na 4 dni przed zabiegiem należy je odstawić za zgodą lekarza rodzinnego, prowadzącego.

UWAGA:

W celu przygotowania oka do operacji proszę zakraplać oko zakwalifikowane do operacji przez 4 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym kroplami z antybiotykiem OFTAQUIX 4 x dziennie 2-3 krople.

1 butelkę kropli 1 % Tropicamidu proszę przynieść ze sobą w dniu operacji (proszę nie otwierać butelki z kroplami).

Postępowanie po zabiegu operacyjnym:

1. pierwsza kontrola w dniu następnym po zabiegu
2. do czasu kontroli nie zdejmować opatrunku
3. regularnie zakraplać operowane oko, ale dopiero po pierwszej wizycie kontrolnej po operacji zgodnie z zaleceniami lekarza
4. przez okres pierwszego tygodnia nosić opatrunek na operowanym oku na noc
5. chronić oko przed urazami: oka operowanego nie dotykać, nie naciskać, nie pocierać
6. całkowite zagojenie rany nastąpi po okresie ok. 3 miesięcy

Proszę przyjść na zabieg z osobą towarzyszącą.